

VII

HERBORISATION AU ST-BERNARD

après la réunion de 1886.

Le Saint-Bernard a tant été visité, exploré, fouillé dans tous les coins et recoins, soit au nord, sur le versant suisse, soit au midi, sur le flanc italien du col, qu'il serait oiseux d'énumérer de nouveau tout ce qui y a été récolté.

Pourtant il faut dire deux mots des *Ranunculus pyrenæus* de l'alpage de la Bauz (sud). La plante se trouve là en immense quantité et sous toutes les formes imaginables, depuis le mignon *pyrenæus* uniflore, à feuilles linéaires-lancéolées, jusqu'aux énormes *pyrenæus v. plantagineus*, à tige ramifiée et pluriflore, et à feuilles larges, présentant souvent çà et là une lacinie ou deux. Comme le *R. aconitifolius* est là tout aussi abondant, on pourrait croire que ces grands *plantagineus* plus ou moins laciniés sont des hybrides, mais il n'en est rien : ce ne sont que des formes exubérantes, produites par un arrosage excessif, surtout à la fonte des neiges et un sol relativement gras, du moins au-dessous des chalets. Une forme pourtant a fort intrigué nos botanistes : elle est de grande taille, plus ou moins ramifiée et présente aussi çà et là des lacinies, mais au lieu d'être glauque comme la var. *plantaginens* et les autres formes du type, elle est verte et ses calices sont exagérés et comme foliacés. M. Wolf et le rapporteur ont pensé d'abord que ce pourrait bien être l'hybride. Mais, réflexion faite et après examen de cette singulière forme, il n'y a décidément là qu'une anomalie, ou plutôt qu'un état maladif : tout ensemble un cas d'hypertrophie et d'albinisme. Ce dernier cas se présente aussi chez les plantes à fleurs blanches, l'*Alsine verna* par exemple. Sur les flancs du Mont-Mort, au sud-est du lac, M. Mermod a trouvé en petite quantité le charmant et rarissime *Androsace glacialis-obtusifolia*.

Dans les pentes au sud-ouest de la cantine de Fontaine (sud

du col), M. Wolf est tombé sur l'unique pied qui ait été rencontré de *Pedicularis incarnata-tuberosa*. Le *P. atrorubeus* n'était pas rare. Quant au *P. recutita-tuberosa*, il peut fort bien se trouver aussi, soit à la Baux, soit plus bas, sous la cantine.

M. Buser a récolté de nombreux *Rosa* entre Saint-Remy et Saint-Oyen, le rapporteur de même; mais ils ne sont pas encore déterminés. M. Buser, qui s'occupe de ce genre désespérant, nous dira prochainement, j'espère, ce qu'il en a fait, ainsi que d'autres récoltes entre Orsières et Bourg-St-Pierre.

Enfin, il a été recueilli sous Fontainte un certain nombre de bons *Hieracium*, entre autres l'*ochroleucum* et le *valdepilosum* v. *Wolfi* Gremli; et sous Bourg-St-Pierre l'*H. Auricula-Peleterianum*. Quant à l'*H. armerioides* Arv.-Touv., sous Proz, il n'a pas été aperçu.

D'autre part, le rapporteur, qui avait précédé de deux jours les autres sociétaires, pour aller explorer la Valsorey, à l'est de Bourg-St-Pierre, n'y a pas trouvé le *Ranunculus lacerus* Bell. (aconitif-pyrenæus), qu'on y a indiqué. Gaudin le cite à la montagne de Mille, vallée de Bagnes.

Et à propos de *Ranunculus*, le *R. aconitoides* ne se trouve plus à l'hospice. Une terrasse qu'on y a formée à l'angle sud-est l'a fait disparaître.

Pour les trois herborisations,
Le rapporteur, L. FAVRAT.

